

# 健康

## 質問

最近、体重が増えて困っています。太るとがんがでさすくになると聞きましたが、本当ですか。体重を減らすにはどうすればいいですか。



柏原 秀也  
徳島大学病院  
地域外科診療部  
特任准教授

## 肥満の影響は？

**回答** 肥満度を表す体格指数として、BMI(Body Mass Index)

があります。これは体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)で表されます。このBMIが18・5未満であれば低体重(痩せ形)、18・5〜25未満であれば普通体重、25以上であれば肥満と定義されています。

肥満は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の大きな要因であるだけでなく、がんのリスクを高めることも分かっています。食べ過ぎや運動不足によって、体内に余った糖を処理するために大量のインスリンが分泌されます。このインスリンの過剰分泌が、がん細胞を増殖しやすくすると言われています。

肥満の男性は食道がんや大腸がん(結腸がん、直腸がん)、胆管がん、膵臓がん、腎細胞がんになりやすく、肥満の女性

# がんのリスク 高める



は卵巣がんと閉経後に乳がんになりやすいと言われています。

肥満に対する治療の基本は、食事療法、運動療法、薬物療法などの内科的治療ですが、BMIが35以上の高度肥満の患者では、内科的治療で一時的に体重の減少が得られてもリバウンドを繰り返す。


し、長期的に見ると内科的治療が成功しないことが多いとされています。このような患者のための肥満外科治療が現在、世界中で注目されています。

## がん何でもクイズ

がん(がん)の語源は、乳がんの腫瘍がある生き物に見えたことからギリシャ時代の医師が名づけた。生き物とは何ですか。  
①セミ ②カニ ③コイ

行こうよ！がん検診

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を示した図




残った部分  
スリーブ状(袖状)の胃管となっている

切除された部分  
胃大彎(たいわん)側の約80%

※徳島大学病院80周年誌より複製

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の傷



# 胃の縮小手術が有効

術後は胃の容量が小さくなり、食事が少しずつしか取れなくなるので摂取エネルギーが減り、結果的に体重が減少します。また手術の後、それまで使っていた内服薬やインスリン注射が少なくなったり、不要になったりすることが数多く報告されています。

このように肥満はさまざまな病気の発症と関係がありますので、一度医師に相談してみましょう。

がんに関する質問は  
徳島がん対策センター  
電話 088 (634) 6442  
(平日午前8時半から午後5時まで)へ。

